

シール貼付け欄

様

	泌一患—WAVE— 1 / 1	(2024. 02)	第2版
パス名	経尿道的前立腺水蒸気手術を受けられる方へ	主治医	
		看護師	

月 日	入院日	手術当日	術後1日目	術後2日目	術後6~7日目	術後10日目
検 査		<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 手術後、膀胱内に管が入ります。</li><li>◆ 手術室入室（ : ）</li><li>◆ 手術後、医師の指示にてモニター装着、酸素投与等させていただきます場合があります。</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 尿の状況で回診時に尿道の管を抜きます。</li><li>◆ 尿の管を抜いた後、排尿の記録を書いていただきます。</li><li>◆ おしっこの残りがいないかチェックさせていただきます。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ ご退院</li></ul> 
注 射	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 内服薬を確認します。内容により中止や変更場合があります。</li></ul> 	<p>【手術前】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 点滴をします。</li></ul> <p>【手術後】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 抗生物質などの点滴をします。</li><li>◆ 翌日まで続けて行います。</li><li>◆ 内服薬再開は指示に従ってください。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 血液検査があります。</li><li>◆ 抗生剤、止血剤などの点滴があります。</li></ul> <p>(10時、22時)</p> 		<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 3日目まで点滴があります。</li><li>◆ 4日目から内服へ切り替えとなります。</li><li>◆ 6日目に血液検査があります。</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 退院後の薬をお渡し致します。</li></ul> 
食 事	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 食事ができます。</li><li>◆ 食事と飲水制限については、入院後説明させていただきます。</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 食事はありません。</li><li>◆ 飲水は指示があります。指示に従ってください。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 朝食から開始します。</li></ul> 			
行 動		<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 手術室から帰ってきたら、翌日の回診までベッド上で安静にしてください。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 経過に問題がなければ、歩行できるようになります。</li></ul>			
清 潔	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 入浴していただきます。（家で入ってこられてもかまいません。）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 手術前の陰部の清潔をさせていただきます。</li><li>◆ 前日入浴されていない方は、シャワー浴をしていただきます。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 清拭します。</li><li>◆ 尿の管を抜くまで陰部保清、ガーゼ交換を毎日行います。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 以後、シャワーに入れます。</li></ul> 		
説 明	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 術後しばらくアメニティセットに入ってください。</li><li>◆ アメニティセットに入れない方は<ul style="list-style-type: none"><li>・前開きのシャツ 1枚</li><li>・浴衣 1枚</li><li>・オムツ（Lサイズ）2枚</li><li>・パット 2枚</li></ul>を持参ください。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 痛みや尿道の管の違和感が強いとき、鎮痛剤を使います。</li><li>◆ 我慢すると血圧が上がり、出血の原因になります。</li><li>◆ 便意が続く、便意があるのに排便がないなどの症状があれば、我慢せずに早めにお知らせください。</li><li>◆ 弾性ストッキングを着用します。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 水分をしっかりとってください。</li></ul> <p>目安 1500ml/day</p> 			<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 外来受診日の確認</li><li>◆ 診察カードをお渡しします。</li><li>◆ 出血したり、尿が出にくい、発熱等の異常があれば、すぐに受診して下さい。</li></ul> 

※ この内容はおよその経過をお知らせするものです。種々の都合により予定通りでないこともあります。

庄原赤十字病院